Treats up to
6,500 sq ft
65 ft x 100 ft

7137623

ACE

SATISFACTION ACE PROMISE GUARANTEED

Soil & Turf Insect Control

Penetrates the ground to kill root eating insects

Controls ants, fleas and ticks

Covers up to 6,500 sq ft

Para el control de insectos en tierra y césped

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior para obtener información adicional sobre las precauciones.

Active Ingredient:
Carbaryl **6.3%**
Other Ingredients **93.7%**

Insecticide

Net Wt
10 lb (4.5 kg)

Soil & Turf Insect Control
Net Wt 10 lb (4.5 kg)
Treats up to 6,500 sq ft
ACE

Soil & Turf Insect Control

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
For outdoor use around the home only.

GENERAL INFORMATION

Use when insects first appear and/or plant damage is noticed. For best control of **root feeding insects** such as grubs, mow lawn first; apply material and then apply ¼" of water to move insecticide down to soil level. It is not necessary to "water in" the granules for surface insect control. **See watering limitations for Sod Webworms.* Keep children and pets off treated areas until grass is dry. Repeat applications may be made at 30 day intervals up to 3 treatments per season for control of new infestations of Sod Webworms.

SURFACE FEEDING INSECTS

For Ants, Fall Armyworms, Centipedes, Chiggers, Earwigs, Millipedes, Fiery Skippers, Grasshoppers, June Beetles, Leafhoppers, Millipedes, Sowbugs, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Yellowstriped Armyworms: Apply 1.5 lb per 1,000 sq ft when insects become a problem or their damage is imminent. Refer to General Information.

For Chinch Bugs and Sod Webworms: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf. For Chinch bugs, treat entire area to prevent their migration.

**For Sod Webworms* do not irrigate treated areas for 24-48 hours after treatment. Repeat applications may be made at 30 day intervals or as needed for control of new infestations.

ROOT FEEDING INSECTS

For control of White Grubs (such as Japanese Beetle, Chafer Beetles and *Phyllophaga spp.* Larvae), Bluegrass Billbugs, Fleas, European Crane Fly Larvae and Black Turfgrass *Ataenius*: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf area during late March through May, or July to early September when grubs are feeding near the soil surface or as recommended by local agricultural extension agents. Water or irrigate turf thoroughly soon after treatment to move the insecticide into the root feeding zone. See General Information.

For Crane Fly Larvae: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf area in early spring: April 1 to April 15 or as recommended by the local Extension Service. Irrigate area after treatment to move granules into root feeding zone.

FLOWERING PLANTS AND SHRUBS

For Cutworms, Armyworms, Sowbugs, Millipedes and Centipedes which attack ornamental and flowering plants in shrubbery and foundation plantings: Apply 1.5 lb of granules evenly over 1,000 sq ft (20 ft x 50 ft). Repeate as needed for control up to 3 times per year.

TREAT LAWNS AND PERIMETER WOODED AREAS FOR CONTROL OF TICKS THAT VECTOR LYME DISEASE

For Control of juvenile and adult *Ixodes spp.* (Deer Tick and Black Legged Tick) and *Amblyomma spp.* Ticks (Lone Star Ticks) which vector Lyme Disease: Apply granules at the rate of 3 lb of product per 1,000 sq ft with appropriate equipment to ensure uniform coverage. Target applications to control juvenile ticks (larvae and nymphs) in late spring or early summer (May/June). Control of adult ticks can be achieved with late summer and fall applications (Aug/Sept). Make applications to lawns, shrub beds, ornamental plantings, wooded areas and around outside perimeters of home and other buildings. Do not make spot applications. Treat entire lawn and perimeter wooded areas and property boundaries where exposure to ticks may occur. For optimum results, irrigate treated areas after application to remove chemical from the granules. Retreat as necessary to maintain adequate control levels.

NUISANCE PEST CONTROL AROUND THE OUTSIDE OF HOMES, PORCHES, PATIOS AND BUILDINGS

For control of Ants, Armyworms, Ticks, Cutworms, Centipedes, Crickets, Earwigs, Firebrats and Silverfish, Fleas, Millipedes, Sowbugs, Scorpions and Spiders: Apply granules at the rate of 1.5 lb per 1,000 sq ft to shrub and flowerbeds, foundations, ornamental plantings and lawn and soil areas immediately adjacent to the building. For most effective control, treated area should be lightly watered after application to remove the chemical from the granules. Re-treat as necessary to control new infestations.

FIRE ANT CONTROL / MOUND TREATMENT

For control of Fire Ants in mounds occurring in lawns, turf and premise areas apply 2 to 3 oz (8 to 14 Tbsp) of granules over and around each mound area. Then gently sprinkle the treated areas with a small amount of water (¼ to ½ gal) to release the chemical from the granules. Do not wash granules away from mound. For best results apply in cool weather (65°F to 80°F) or early morning or late afternoon. Re-treat new mounds as they may appear.

SPREADER SETTINGS (AJUSTES DEL DIFUSOR)

Spreader Make and Model Marca y modelo del difusor	1.5 lb per 1,000 sq ft 1,5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m²)	3 lb per 3,000 sq ft 3 lb por cada 3.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 279 m²)
CYCLONE		
Broadcast	3.5	4.25
RED DEVIL		
Drop	0.5	1
Rotary	1.5	3
REPUBLIC		
Drop EZ530	6.5	8
Broadcast EZ540	1	2
SCOTTS		
SpeedyGreen 3000	3	4.5
AccuGreen 3000	3.25	5.25
SEARS		
Drop 1935	6	8
Broadcast 1922	1	2

Note: The spreader settings listed are approximate due to variability and wear of spreader. Check settings and calibrations on a small area before making total application.
Aviso: Los ajustes del calibrador que se indican aquí son aproximados, debido a la variabilidad y desgaste del difusor. Verifique los ajustes y calibraciones en un área pequeña antes de efectuar la aplicación total.

Para el control de insectos en tierra y césped

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

MODO DE EMPLEO El empleo de este producto de manera contraria a las indicaciones expresadas en su etiqueta representa una violación a la ley federal. *Para usarse en espacios exteriores alrededor de la casa únicamente.*

INFORMACIÓN GENERAL Use/lo cuando los insectos aparezcan por primera vez y/o se observen daños en las plantas por primera vez. Para controlar mejor a los ***insectos que se alimentan de las raíces,*** como las larvas, corte el césped primero; aplique el producto y después vierta 1/4" (0,6 cm) de agua para que el insecticida penetre en la tierra. No es necesario "regar" los gránulos para controlar a los insectos de la superficie. **Consulte las restricciones de riego para las especies de práilidos.* Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el césped esté seco. Para controlar nuevas infestaciones de pirálidos, se pueden repetir las aplicaciones hasta completar 3 tratamientos por estación, a intervalos de 30 días.

INSECTOS QUE SE ALIMENTAN EN LA SUPERFICIE: *Para hormigas, gusanos soldados, ciempiés, piojos, lepismas, milpiés, cochinillas de la humedad, mariposa saltadora flamenca, saltamontes, coleópteros, cicadélidos, milpiés, cochinillas de la humedad, cercópidos, tisanuros, garrapatas y gusanos soldados de manchas amarillas:* Aplique 1.5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m²) cuando los insectos se transformen en un problema o el daño que provocan sea inminente. Consulte la información general.

Para chinches de los cereales y pirálidos: Aplique 3 lb del producto por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m²) de césped. Para chinches de los cereales, trate toda el área para evitar que emigren. **Para los pirálidos no riegue las áreas tratadas durante* 24 a 48 horas después del tratamiento. Se pueden repetir las aplicaciones a intervalos de 30 días o cuando sea necesario para el control de nuevas infestaciones.

INSECTOS QUE SE ALIMENTAN DE LAS RAÍCES *Para el control de larvas de coleópteros (como el escarabajo japonés, escarabajos y larvas de Phyllophaga spp.) coleópteros del género Sphenophorus (Bluegrass Billbugs), pulgas, larvas de Tipula paludosa (European Crane Fly) y escarabajos cordópagos Ataenius:* Aplique 3 lb por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m²) de césped desde fines de marzo hasta mayo, o desde julio hasta principios de septiembre, cuando las larvas se alimentan cerca de la superficie de la tierra, o según lo que recomienden los representantes del servicio de extensión agrícola. Riegue o irrigue el césped a fondo inmediatamente después del tratamiento para que el insecticida penetre en la zona de alimentación de la raíz. Consulte la información general.

Para las larvas de Tipula paludosa: Aplique 3 lb por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m²) de superficie de césped a principios de primavera: desde el 1º hasta el 15 de abril o según lo que recomiende el servicio de extensión local. Riegue el área después del tratamiento para que los gránulos penetren en la zona de alimentación de la raíz.

PLANTAS FLORALES Y ARBUSTOS *Para especies de la familia Noctuidae (Cutworms), gusanos soldados, cochinillas de la humedad, milpiés y ciempiés que atacan plantas florales y ornamentales en plantaciones de arbustos y de semillas originales:* Aplique uniformemente 1,5 lb de gránulos sobre 1.000 pies cuadrados (20 pies x 50 pies) (93 m² 0 6 m por 15 m). Para el control, repita según sea necesario, hasta 3 veces por año.

TRATE EL CÉSPED Y LAS ZONAS ARBOLADAS QUE LO RODEAN PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD DE LYME *Para el control de individuos jóvenes y adultos de Ixodes spp. (garrapata del venado y de pierna negra) y de Amblyomma spp., garrapatas (garrapatas de la estrella solitaria) que transmiten la enfermedad de Lyme:* Aplique los gránulos a la dosis de 3 lb del producto por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m²) con el equipo adecuado para asegurar una cobertura uniforme. Concentre las aplicaciones para controlar a las garrapatas jóvenes (larvas y ninfas) a fines de primavera o principios del verano (mayo/junio). El control de las garrapatas adultas se puede lograr con aplicaciones a fines de verano y otoño (agosto/septiembre). Aplique el producto a céspedes, leches con arbustos, plantas ornamentales, zonas de bosque y alrededor de los límites exteriores de los casa y otros edificios. No efectúe aplicaciones localizadas. Trate todo el césped, las zonas arboladas que lo rodean y los límites de la finca donde pueda haber contacto con las garrapatas. Para obtener óptimos resultados, después de la aplicación riegue las zonas tratadas para desprender la sustancia química de los gránulos. Repita el tratamiento cuando sea necesario para mantener los niveles de control adecuados.

CONTROL DE INSECTOS MOLESTOS ALREDEDOR DE CASAS EXTERIORES DE CASAS, PORCHES, PATIOS Y EDIFICIOS *Para el control de hormigas, gusanos soldados, garrapatas, especies de la familia Noctuidae (Cutworms), ciempiés, grillos, tijeretas, tisanuros y lepismas, pulgas, milpiés, cochinillas de la humedad, escorpiones y arañas:* Aplique los gránulos a la dosis de 1,5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m²) a arbustos, leches de flores, cimientos, plantas ornamentales y superficies de césped y tierra inmediatamente adyacentes al edificio. Para que el control sea más eficaz, la superficie tratada se debe regar ligeramente después de la aplicación para desprender la sustancia química de los gránulos. Repita el tratamiento cuando sea necesario para controlar nuevas infestaciones.

CONTROL DE HORMIGAS BRAVAS / TRATAMIENTO DE LOS MONTÍCULOS Para el control de las hormigas bravas que se encuentran en montículos situados en superficies de césped y zonas donde hay edificios, aplique 2 a 3 onzas (56 a 85 g o 8 a 14 cucharadas soperas) de gránulos por encima y alrededor de la zona de cada montículo. Después rocíe las zonas tratadas con una pequeña cantidad de agua (1/4 a 1/2 galón (1,1 a 2,2 l) para desprender la sustancia química de los gránulos. No quite los gránulos del montículo al rociar con agua. Para obtener mejores resultados, aplíquelo cuando el clima esté fresco, entre 65 y 80ºF (18 y 27ºC) o bien temprano en la mañana o al anochecer. Repita el tratamiento con los nuevos montículos a medida que aparezcan.

STORAGE & DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
Storage: Keep out of reach of children and animals. Store product in original container in a cool, dry place and avoid excess heat. **Disposal: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals
CAUTION. Harmful if swallowed or inhaled. Avoid breathing dust. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling and before eating or smoking.

First Aid

In case of accidental...	*Immediately...*
Swallowing	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Contact with Eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 10-15 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice.
Contact with Skin or Clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice.
Inhalation of Dust	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, and then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Note to Physician: Carbaryl is an N-methyl carbamate that inhibits cholinesterase. Atropine is antidotal.

Hot Line Number: 1-800-917-5423.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua ni los alimentos para personas ni animales mediante el almacenamiento o la eliminación.
Almacenamiento: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales. Almacénelo en su envase original en un lugar fresco y seco y evite el calor excesivo. **Eliminación si está vacío,** no vuelva a utilizar este envase. Deséchelo en la basura o ofrézcalo para reciclarlo, si existe esa opción. **Si está parcialmente lleno,** llame al organismo local que se encarga de los desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones sobre su eliminación. Nunca elimine el producto sin usar por desagües interiores ni exteriores.

PRECAUCIONES

Es nocivo para los seres humanos y los animales domésticos
PRECAUCIÓN: Es nocivo si es ingerido o es inhalado. Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese muy bien después de manipular el producto y antes de comer o fumar.

Primeros Auxilios

En el caso de que accidentalmente...	*Inmediatamente...*
Sea ingerido,	• Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento. • Si la persona puede tragar, hágale beber poco a poco un vaso de agua. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de toxicología o el médico. • No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Entre en contacto con los ojos,	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si lleva lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento.
Entre en contacto con la piel o la ropa,	• Quítese la ropa contaminada. • Lávese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento.
El polvo sea inhalado,	• Saque a la persona al aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento adicional.

Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de toxicología o al médico, o cuando acuda para recibir tratamiento.

Nota al médico: El carbarilo es un N-metil carbamato que inhibe la colinesterasa. El antídoto es la atropina.

Número directo: 1-800-917-5423.

NUISANCE PEST CONTROL AROUND THE OUTSIDE OF HOMES, PORCHES, PATIOS AND BUILDINGS

For control of Ants, Armyworms, Ticks, Cutworms, Centipedes, Crickets, Earwigs, Firebrats and Silverfish, Fleas, Millipedes, Sowbugs, Scorpions and Spiders: Apply granules at the rate of 1.5 lb per 1,000 sq ft to shrub and flowerbeds, foundations, ornamental plantings and lawn and soil areas immediately adjacent to the building. For most effective control, treated area should be lightly watered after application to remove the chemical from the granules. Re-treat as necessary to control new infestations.

FIRE ANT CONTROL / MOUND TREATMENT

For control of Fire Ants in mounds occurring in lawns, turf and premise areas apply 2 to 3 oz (8 to 14 Tbsp) of granules over and around each mound area. Then gently sprinkle the treated areas with a small amount of water (¼ to ½ gal) to release the chemical from the granules. Do not wash granules away from mound. For best results apply in cool weather (65°F to 80°F) or early morning or late afternoon. Re-treat new mounds as they may appear.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.
NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es sumamente tóxico para los invertebrados acuáticos. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando limpie los aguas del lavado del equipo. Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en los maíceos o en los cultivos florecientes. No aplique este producto ni permita su arrastre en los maíceos o en los cultivos florecientes si las abejas se encuentran en la zona de tratamiento.
AVISO: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

The ACE® Promise
If We Are Product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de ACE®
Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen en forma gratuita por uno igual o similar.

SATISFACTION GUARANTEED ACE PROMISE

Questions or comments? Call 1-800-917-5423.
Distributed by Chemsico, Div. of United Industries Corp.
P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 8660-21-9688
EPA Est. Nos. 9198-OH-1Ⓞ, 9198-OH-2Ⓞ, 8660-AL-1Ⓔ, 44618-MO-1Ⓒ, 44618-CA-1Ⓒ, 9688-MO-1Ⓒ, 8660-OH-1Ⓞ, 572-NJ-1Ⓒ, 39578-TX-1Ⓒ, 62793-MO-1Ⓒ, 58996-MO-1Ⓒ, 69208-MO-1Ⓒ.
Circled letter is first letter of lot number. 11-7348
Made in the USA for Ace Hardware Corporation
Oak Brook, Illinois 60523, USA ©2003
Ace is a trademark of Ace Hardware Corp.
Fabricado en EE.UU. para Ace Hardware Corporation
Oak Brook, Illinois 60523, EE. UU. ©2003

FPO UPC
replace and verify readability
0 82801 10949 1

Treats up to
6,500 sq ft
65 ft x 100 ft

7137623

Soil & Turf Insect Control

ACE

Soil & Turf Insect Control

SATISFACTION ACE PROMISE GUARANTEED

Penetrates the ground to kill root eating insects

Kills Grubs on Contact

Treats up to 6,500 sq ft

Net Wt 10 lb (4.5 kg)

eating insects

Controls ants, fleas and ticks

Covers up to 6,500 sq ft



Para el control de insectos en tierra y césped

Active Ingredient:
Carbaryl **6.3%**
Other Ingredients **93.7%**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back for additional precautionary statements.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior para obtener información adicional sobre las precauciones.

Insecticide

Net Wt
10 lb (4.5 kg)

ACE

Soil & Turf Insect Control

Treats up to 6,500 sq ft

Net Wt 10 lb (4.5 kg)

7137623

Soil & Turf Insect Control

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For outdoor use around the home only.*

GENERAL INFORMATION

Use when insects first appear and/or plant damage is noticed. For best control of **root feeding insects** such as grubs, mow lawn first; apply material and then apply ¼" of water to move insecticide down to soil level. It is not necessary to "water in" the granules for surface insect control. *See watering limitations for Sod Webworms. Keep children and pets off treated areas until grass is dry. Repeat applications may be made at 30 day intervals up to 3 treatments per season for control of new infestations of Sod Webworms.

SURFACE FEEDING INSECTS

For Ants, Armyworms, Centipedes, Chiggers, Earwigs, Fall Millipedes, Fiery Skippers, Grasshoppers, June Beetles, Leafhoppers, Millipedes, Sowbugs, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Yellowstriped Armyworms: Apply 1.5 lb per 1,000 sq ft when insects become a problem or their damage is imminent. Refer to General Information.

For Chinch Bugs and Sod Webworms: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf. For Chinch bugs, treat entire area to prevent their migration.

*For Sod Webworms do not irrigate treated areas for 24-48 hours after treatment. Repeat applications may be made at 30 day intervals or as needed for control of new infestations.

ROOT FEEDING INSECTS

For control of White Grubs (such as Japanese Beetle, Chafer Beetles and *Phyllophaga spp.* Larvae), Bluegrass Billbugs, Fleas, European Crane Fly Larvae and Black Turfgrass *Ataenius*: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf area during late March through May, or July to early September when grubs are feeding near the soil surface or as recommended by local agricultural extension agents. Water or irrigate turf thoroughly soon after treatment to move the insecticide into the root feeding zone. See General Information.

For Crane Fly Larvae: Apply 3 lb per 1,000 sq ft of turf area in early spring: April 1 to April 15 or as recommended by the local Extension Service. Irrigate area after treatment to move granules into root feeding zone.

FLOWERING PLANTS AND SHRUBS

For Cutworms, Armyworms, Sowbugs, Millipedes and Centipedes which attack ornamental and flowering plants in shrubbery and foundation plantings: Apply 1.5 lb of granules evenly over 1,000 sq ft (20 ft x 50 ft). Repeat as needed for control up to 3 times per year.

TREAT LAWNS AND PERIMETER WOODED AREAS FOR CONTROL OF TICKS THAT VECTOR LYME DISEASE

For Control of juvenile and adult *Ixodes spp.* (Deer Tick and Black Legged Tick) and *Amblyomma spp.* Ticks (Lone Star Ticks) which vector Lyme Disease: Apply granules at the rate of 3 lb of product per 1,000 sq ft with appropriate equipment to ensure uniform coverage. Target applications to control juvenile ticks (larvae and nymphs) in late spring or early summer (May/June). Control of adult ticks can be achieved with late summer and fall applications (Aug/Sept). Make applications to lawns, shrub beds, ornamental plantings, wooded areas and around outside perimeters of home and other buildings. Do not make spot applications. Treat entire lawn and perimeter wooded areas and property boundaries where exposure to ticks may occur. For optimum results, irrigate treated areas after application to remove chemical from the granules. Retreat as necessary to maintain adequate control levels.

NUISANCE PEST CONTROL AROUND THE OUTSIDE OF HOMES, PORCHES, PATIOS AND BUILDINGS

For control of Ants, Armyworms, Ticks, Cutworms, Centipedes, Crickets, Earwigs, Firebrats and Silverfish, Fleas, Millipedes, Sowbugs, Scorpions and Spiders: Apply granules at the rate of 1.5 lb per 1,000 sq ft to shrub and flowerbeds, foundations, ornamental plantings and lawn and soil areas immediately adjacent to the building. For most effective control, treated area should be lightly watered after application to remove the chemical from the granules. Re-treat as necessary to control new infestations.

FIRE ANT CONTROL / MOUND TREATMENT

For control of Fire Ants in mounds occurring in lawns, turf and premise areas apply 2 to 3 oz (8 to 14 Tbsp) of granules over and around each mound area. Then gently sprinkle the treated areas with a small amount of water (¼ to ½ gal) to release the chemical from the granules. Do not wash granules away from mound. For best results apply in cool weather (65°F to 80°F) or early morning or late afternoon. Re-treat new mounds as they may appear.

SPREADER SETTINGS (AJUSTES DEL DIFUSOR)

Spreader Make and Model Marca y modelo del difusor	1.5 lb per 1,000 sq ft 1,5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m²)	3 lb per 3,000 sq ft 3 lb por cada 3.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 279 m²)
CYCLONE		
Broadcast	3.5	4.25
RED DEVIL		
Drop	0.5	1
Rotary	1.5	3
REPUBLIC		
Drop EZ530	6.5	8
Broadcast EZ540	1	2
SCOTTS		
SpeedyGreen 3000	3	4.5
AccuGreen 3000	3.25	5.25
SEARS		X X
Drop 1935	6	8
Broadcast 1922	1	2

Note: The spreader settings listed are approximate due to variability and wear of spreader. Check settings and calibrations on a small area before making total application.

Aviso: Los ajustes del calibrador que se indican aquí son aproximados, debido a la variabilidad y desgaste del difusor. Verifique los ajustes y calibraciones en un área pequeña antes de efectuar la aplicación total.

Para el control de insectos en tierra y césped

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

Para el control de insectos en tierra y césped

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

MODO DE EMPLEO El empleo de este producto de manera contraria a las indicaciones expresadas en su etiqueta representa una violación a la ley federal. *Para usarse en espacios exteriores alrededor de la casa únicamente.*

INFORMACIÓN GENERAL Úselo cuando los insectos aparezcan por primera vez y/o se observen daños en las plantas por primera vez. Para controlar mejor a los ***insectos que se alimentan de las raíces,*** como las larvas, corte el césped primero; aplique el producto y después vierta 1/4" (0,6 cm) de agua para que el insecticida penetre en la tierra. No es necesario "regar" los gránulos para controlar a los insectos de la superficie. *Consulte las restricciones de riego para las especies de pirálidos. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el césped esté seco. Para controlar nuevas infestaciones de pirálidos, se pueden repetir las aplicaciones hasta completar 3 tratamientos por estación, a intervalos de 30 días.

INSECTOS QUE SE ALIMENTAN EN LA SUPERFICIE ***Para hormigas, gusanos soldados, ciempiés, piques, tijeretas, milpiés de otoño, mariposa saltadora flameante, saltamontes, coleópteros, cicadélidos, milpiés, cochinillas de la humedad, cercópidos, tisanuros, garrapatas y gusanos soldados de manchas amarillas:*** Aplique 1,5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m^2) cuando los insectos se transformen en un problema o el daño que provocan sea inminente. Consulte la información general.

Para chinches de los cereales y pirálidos: Aplique 3 lb del producto por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m^2) de césped. Para chinches de los cereales, trate toda el área para evitar que emigren. *Para los pirálidos no riegue las áreas tratadas durante 24 a 48 horas después del tratamiento. Se pueden repetir las aplicaciones a intervalos de 30 días o cuando sea necesario para el control de nuevas infestaciones.

INSECTOS QUE SE ALIMENTAN DE LAS RAÍCES ***Para el control de larvas de coleópteros (como el escarabajo japonés, escarabajos y larvas de Phyllophaga spp.) coleópteros del género Sphenophorus (Bluegrass Billbugs), pulgas, larvas de Típula paludosa (European Crane Fly) y escarabajos coprófagos Ataenius:*** Aplique 3 lb por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m^2) de césped desde fines de marzo hasta mayo, o desde julio hasta principios de septiembre, cuando las larvas se alimentan cerca de la superficie de la tierra, o según lo que recomienden los representantes del servicio de extensión agrícola. Riegue o irrigue el césped a fondo inmediatamente después del tratamiento para que el insecticida penetre en la zona de alimentación de la raíz. Consulte la información general.

Para las larvas de Tipula paludosa: Aplique 3 lb por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m^2) de superficie de césped a principios de primavera: desde el 1º hasta el 15 de abril o según lo que recomiende el servicio de extensión local. Riegue el área después del tratamiento para que los gránulos penetren en la zona de alimentación de la raíz.

PLANTAS FLORALES Y ARBUSTOS ***Para especies de la familia Noctuidae (Cutworms), gusanos soldados, cochinillas de la humedad, milpiés y ciempiés que atacan plantas florales y ornamentales en plantaciones de arbustos y de semillas originales:*** Aplique uniformemente 1,5 lb de gránulos sobre 1.000 pies cuadrados (20 pies x 50 pies) (93 m^2 ó 6 m por 15 m) . Para el control, repita según sea necesario, hasta 3 veces por año.

TRATE EL CÉSPED Y LAS ZONAS ARBOLADAS QUE LO RODEAN PARA CONTROLAR A LAS GARRAPATAS QUE TRANSMITEN LA ENFERMEDAD DE LYME ***Para el control de individuos jóvenes y adultos de Ixodes spp. (garrapata del venado y de pierna negra) y de Amblyomma spp., garrapatas (garrapatas de la estrella solitaria) que transmiten la enfermedad de Lyme:*** Aplique los gránulos a la dosis de 3 lb del producto por cada 1.000 pies cuadrados (1,4 kg por cada 93 m^2) con el equipo adecuado para asegurar una cobertura uniforme. Concentre las aplicaciones para controlar a las garrapatas jóvenes (larvas y ninfas) a fines de primavera o principios del verano (mayo/junio). El control de las garrapatas adultas se puede lograr con aplicaciones a fines de verano y otoño (agosto/septiembre). Aplique el producto a céspedes, lechos con arbustos, plantas ornamentales, zonas arboladas y alrededor de la zona exterior de la casa y otros edificios. No efectúe aplicaciones localizadas. Trate todo el césped, las zonas arboladas que lo rodean y los límites de la finca donde pueda haber contacto con las garrapatas. Para obtener óptimos resultados, después de la aplicación riegue las zonas tratadas para desprender la sustancia química de los gránulos. Repita el tratamiento cuando sea necesario para mantener los niveles de control adecuados.

CONTROL DE INSECTOS MOLESTOS ALREDEDOR DE ZONAS EXTERIORES DE CASAS, PORCHES, PATIOS Y EDIFICIOS ***Para el control de hormigas, gusanos soldados, garrapatas, especies de la familia Noctuidae (Cutworms), ciempiés, grillos, tijeretas, tisanuros y lepismas, pulgas, milpiés, cochinillas de la humedad, escorpiones y arañas:*** Aplique los gránulos a la dosis de 1,5 lb por cada 1.000 pies cuadrados (0,7 kg por cada 93 m^2) a arbustos, lechos de flores, cimientos, plantas ornamentales y superficies de césped y tierra inmediatamente adyacentes al edificio. Para que el control sea más eficaz, la superficie tratada se debe regar ligeramente después de la aplicación para desprender la sustancia química de los gránulos. Repita el tratamiento cuando sea necesario para controlar nuevas infestaciones.

CONTROL DE HORMIGAS BRAVAS / TRATAMIENTO DE LOS MONTÍCULOS Para el control de las hormigas bravas que se encuentran en montículos situados en superficies de césped y zonas donde hay edificios, aplique 2 a 3 onzas (56 a 85 g u 8 a 14 cucharadas soperas) de gránulos por encima y alrededor de la zona de cada montículo. Después rocíe las zonas tratadas con una pequeña cantidad de agua (1/4 a 1/2 galón ó 1,1 a 2,2 l) para desprender la sustancia química de los gránulos. No quite los gránulos del montículo al rociar con agua. Para obtener mejores resultados, aplíquelo cuando el clima esté fresco, entre 65 y 80ºF (18 y 27ºC) o bien temprano en la mañana o al anochecer. Repita el tratamiento con los nuevos montículos a medida que aparezcan.

STORAGE & DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
Storage: Keep out of reach of children and animals. Store product in original container in a cool, dry place and avoid excess heat. **Disposal: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals
CAUTION. Harmful if swallowed or inhaled. Avoid breathing dust. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling and before eating or smoking.

First Aid

In case of accidental...	*Immediately...*
Swallowing	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Contact with Eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 10-15 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice.
Contact with Skin or Clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice.
Inhalation of Dust	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, and then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.	
Note to Physician: Carbaryl is an N-methyl carbamate that inhibits cholinesterase. Atropine is antidotal.	
Hot Line Number: 1-800-917-5423.	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua ni los alimentos para personas ni animales mediante el almacenamiento o la eliminación.
Almacenamiento: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales. Almacénelo en su envase original en un lugar fresco y seco y evite el calor excesivo. **Eliminación: Si está vacío,** no vuelva a utilizar este envase. Deséchelo en la basura u ofrézcalo para reciclarlo, si existe esa opción. **Si está parcialmente lleno,** llame al organismo local que se encarga de los desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones sobre su eliminación. Nunca elimine el producto sin usar por desagües interiores ni exteriores.

PRECAUCIONES

Es nocivo para los seres humanos y los animales domésticos
PRECAUCIÓN: Es nocivo si es ingerido o es inhalado. Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese muy bien después de manipular el producto y antes de comer o fumar.

Primeros Auxilios

En el caso de que accidentalmente…	*Inmediatamente...*
Sea ingerido,	• Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento. • Si la persona puede tragar, hágale beber poco a poco un vaso de agua. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de toxicología o el médico. • No le administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Entre en contacto con los ojos,	• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos con agua lentamente, con cuidado, durante 10 a 15 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagándose los ojos. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento.
Entre en contacto con la piel o la ropa,	• Quítese la ropa contaminada. • Lávese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento.
El polvo sea inhalado,	• Saque a la persona al aire fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego adminístrele respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le indiquen el tratamiento adicional.
Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de toxicología o al médico, o cuando acuda para recibir tratamiento.	
Nota al médico: El carbarilo es un N-metil carbamato que inhibe la colinesterasa. El antídoto es la atropina.	
Número directo: 1-800-917-5423.	

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.
NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Riesgos para el medio ambiente
Este producto es sumamente tóxico para los invertebrados acuáticos. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando elimine las aguas del lavado del equipo. Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en las malezas o en los cultivos florecientes. No aplique este producto ni permita su arrastre en las malezas o en los cultivos florecientes si las abejas se encuentran en la zona de tratamiento.
AVISO: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

The ACE® Promise
If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de ACE®
Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

Questions or comments? Call 1-800-917-5423.
Distributed by Chemsico, Div. of United Industries Corp.
P.O. Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 8660-21-9688
EPA Est. Nos. 9198-OH-1(M), 9198-OH-2(B), 8660-AL-1(BN), 44616-MO-1(G), 44616-GA-1(D), 9688-MO-1(U), 8660-OH-1(BO), 572-NJ-1(T), 39578-TX-1(AM), 62793-MO-1(AP), 58996-MO-1(AE), 69208-MO-1(AO).
Circled letter is first letter of lot number. 11-7348
Made in the USA for Ace Hardware Corporation
Oak Brook, Illinois 60523, USA ©2003
Ace is a trademark of Ace Hardware Corp.
Fabricado en EE.UU. para Ace Hardware Corporation
Oak Brook, Illinois 60523, EE. UU. ©2003

FPO UPC
replace and verify readability
0 82901 15049 7